

El bosque templado del sur de Chile

Una mirada a su fauna y paisajes

Paisajes y bosques del sur



Cumbres de Araucaria (*Araucaria araucana*) al finalizar el día

Autor: Jerry Laker



Lago Caburgua-Tinquilco-y volcán Llaima

Autor: Jerry Laker



Coordillera de Namuncahue

Autor: Jerry Laker



Volcan Villarrica y alrededores

Autor: Jerry Laker



Invierno en la comuna de Pucón

Autor: Jerry Laker



Salto Huilo-Huilo

Autor: Jerry Laker



Inverno en el bosque precordillerano de la Araucanía

Autor: Jerry Laker



Invierno en bosques de Lenga (*Nothofagus pumilio*)

Autor: Jerry Laker



Otoño en la Araucanía

Autor: Jerry Laker



Todos los niveles del bosque templado

Autor: Jerry Laker

Fauna



Puma (*Puma concolor*) Felino más grande de Chile, solitario y territorial.

Autor: Nicolás Gálvez



Pudu (*Pudu pudu*) Segundo ciervo más pequeño del mundo, asociado principalmente a bosque nativo .

Autor: Nicolás Gálvez



Güiña (*Leopardus guigna*). Felino gran consumidor de roedores

Autor: Nicolás Gálvez



Güiña (*Leopardus guigna*) Existen individuos melánico o negros. Sobre el pelaje negro igual mantiene las manchas.

Autor: Nicolás Gálvez



Puma (*Puma concolor*) Es un gran consumidor de liebres plaga

Autor: Gálvez-Laker-Bonacic



Jabalí (*Sus scrofa*) Especie de origen Europeo considerada plaga por el daño que causa en el bosque y a cultivos agrícolas

Autor: Nicolás Gálvez



Jabatos de la plaga Jabalí (*Sus scrofa*) que muestra su prolificidad.

Autor: Nicolás Gálvez



Zorro Chilla (*Lycalopex griseus*) en bosque de Araucaria

Autor: Nicolás Gálvez



Puma (*Puma concolor*). Gran distribución desde Magallanes hasta Alaska.

Lugar: Araucanía Autor: Gálvez-Murphy



Güiña (*Leopardus guigna*). Prefiere bosque denso y quebradas

Autor: Gálvez-Hernández-Ohrens



Pudu (*Pudu pudu*). Está amenazado por lo perros domésticos.

Autor: Tomás Ibarra



Cervatillo Pudu (*Pudu pudu*). Además por pérdida de hábitat.

Autor: Andrés Charrier



Cervatillo Pudu (*Pudu pudu*). Nace con manchas blancas

Autor: Andrés Charrier



Zorro chilla (*Lycalopex griseus*). Cánido de tamaño medio, vive en ambientes abiertos y presenta hábitos crepusculares. Autor: Thomas Kramer



Zorro de Darwin (*Lycalopex fulvipes*) Pequeño zorro que vive exclusivamente en Chiloé y Nahuelbuta (Araucanía).

Autor: Andrés Charrier



Huemul (*Hippocamelus bisulcus*). Ciervo de gran tamaño y amenazado por pérdida de hábitat y perros domésticos.

Autor: Thomas Kramer



Güiña (*Leopardus guigna*). Felino principalmente nocturno.

Autor: Andrés Charrier



Monito del monte (*Dromiciops gliroides*), Es un marsupial considerado un fósil viviente. Es la única especie de su orden y está más emparentado con los marsupiales en Australia, como por ejemplo Koala y demonio de Tazmania, que con los marsupiales americanos. Mantiene una interacción con una planta (Quintral) como principal dispersor de semillas desde hace 70 millones de años.

Autor: Andrés Charrier



Monito del monte (*Dromiciops gliroides*) En invierno entra en hibernación o sopor.

Autor: Andrés Charrier



Carpintero Negro hembra (*Campephilus magellanicus*). Es el carpintero más grande de Sud América y gran tallador de los bosques, donde busca larvas de escarabajos.

Autor: Thomas Kramer



Pitío (*Colaptes pitius*). Carpintero de amplia distribución, que acostumbra a nidificar en laderas escarpadas.

Autor: Thomas Kramer



Chercán (*Troglodytes aedon*). Muy común en jardines y matorral.

Autor: Thomas Kramer



Chucao (*Scelorchilus rubecula*). Ave representativa del bosque templado, conocida por su inconfundible y explosivo canto.

Autor: Thomas Kramer



Chuncho (*Glaucidium nanum*). Búho de difícil observación, debido a su pequeño tamaño y silencioso vuelo.

Autor: Thomas Kramer



Cometocino patagónico (*Phrygilus patagonicus*). Ave ampliamente distribuido y abundante. Gran consumidor de semillas.

Autor: Jerry Laker



Colilarga (*Sylviorhynchus desmursii*). Ave que utiliza las partes bajas del bosque donde abunda la quila.

Autor: Tomás Ibarra



Concón (*Strix rufipes*). Búho de gran tamaño. Come muchos ratones, y ocupa agujeros de árboles antiguos para hacer su nido.

Autor: Tomás Ibarra



Fío fío (*Elaenia albiceps*). El fío fío llega cada año desde latitudes tropicales, para reproducirse en los bosques del sur de Chile.

Autor: Tomás Ibarra



Picaflor chico (*Sephanoides sephanioides*). El picaflor es uno de los encargados de polinizar las flores en el bosque, especialmente las de color rojo.

Autor: Tomás Ibarra



Nido de Picaflor (*Sephanoides sephanioides*). Generalmente lo encontramos en arbustos y árboles pequeños bajo el bosque nativo. Su principal amenaza es la pérdida de bosque nativo.

Autor: Andres Charrier



Rana arborícola (*Hylorina sylvatica*). Los anfibios de Chile, en su mayoría exclusivos de Chile, están siendo amenazados por el cambio climático, pérdida de hábitat y enfermedades.

Autor: Andrés Charrier




Ranita de Darwin (*Rhinoderma darwinii*) Anfibio exclusivo de Chile, experto en camuflarse con el suelo del bosque. Otra especie del mismo género (*Rhinoderma rufum*) que vivía desde Concepción al norte ya está extinto

Autor: Andrés Charrier



Anfibio (*Eupsophus* sp) en una hoja de Nalca.

Autor: Andrés Charrier



Mariposa de cuatro ojos (*Polythisana cinerascens*). Mariposa de actividad nocturna que se alimenta de hojas del bosque. Está amenazada por pérdida de bosque nativo.

Autor Andres Charrier



Mariposa (*Yramea* sp.) Lepidóptero presente en una gran variedad de ambientes, encontrándose casi siempre posado en el suelo.

Autor: Thomas Kramer



Musgo con mosca (*Tayloria mirabilis*) Es una interacción única en el mundo entre una mosca y un musgo. El musgo tiene un mal olor que atrae a las moscas. Ellas se acercan y las esporas se pegan al cuerpo de la mosca, para luego ser dispersadas.

Autor: Tomás Ibarra



Lagartija esbelta (*Liolaemus tenuis*) Reptil arborícola, que se caracteriza por su alta territorialidad y sus acentuados cambios de colorido

Autor: Thomas Kramer

